

NOUVELLE DIRECTIVES – RN PSE1 applicable depuis Février 2007

Les 3 signes de l'arrêt cardio respiratoire ACR

1. → INCONSCIENCE (ne répond pas, ne réagit pas)
2. → VENTILATION (absence vérifier pendant 10 sec au plus)
3. → CIRCULATION (absence signes de signes de vie, absence réaction / absence pouls carotidien vérifier au 10 sec plus)

RCP1 Secouriste seul avec ou sans matériel	RCP 2 Secouristes avec ou sans matériel
<ul style="list-style-type: none"> - réalise protection (préambule obligatoire) - apprécie l'état de conscience - appel à l'aide - assure la LVA 3C - vérifie l'absence de ventilation - alerte précoce si adulte hors cas particulier (victime noyade...)ou fait alerter demande DEA si disponible. - Après l'alerte, vérifie l'absence de circulation et si ACR.. - détermine la zone d'appui visuel - RCP 30/2 5 cycles pour un adulte - contrôle pouls carotidien - poursuit l'alternance 30/2 si ACR.. jusqu'à la prise en charge d'un service médicalisé <p><i>Si pouls présent mais pas de ventilation :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - réalise 10 insufflations puis contrôle ventilation, circulation,etc... <p><i>Utilisation d'un masque de poche, ou autre protection si possible</i></p> <p><i>Détresse ventilatoire si les mouvements respiratoire de la victime sont inférieur à 6 par minute..</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - réaliser protection (préambule obligatoire) - apprécier l'état de conscience - assurer la LVA - vérifier l'absence de ventilation - Alerte par le 2^{ème} secouriste et demande du renfort - vérifier l'absence de circulation, pouls carotidien - le secouriste qui a commencé le bilan entame la RCP 30/2 (adulte) seul durant l'absence du 2^{ème} secouriste. - le 2^{ème} secouriste revient de l'alerte et installe le protocole DAE/DSA. - RCP à deux dès que possible avec ou sans matériel. (utilisation DAE/DSA et O2 et autre matériel disponible dès que possible.) -A la fin du 1^{er} cycle de 5 x 30/2 le 1^{er} secouriste contrôle le pouls et s'occupe de l'O2. Le 2^{ème} secouriste se met au MCE et manipule le DAE/DSA.. <p>Mettre le DAE/DSA sur de la côté oreille gauche ! (fils et position des électrodes) L'oxygénothérapie (O2) sur l'arrière de la victime sur le côté opposé du DAE/DSA.</p>

ATTENTION :

Adulte en arrêt depuis plus de 5 minutes : 5 cycles de 30/2 avant d'installer le protocole DAE/DSA.

Enfant en arrêt depuis plus de 5 minutes : 10 cycles de 15/2 avant le protocole DAE/DSA.

Important : Le protocole DAE ou DSA s'installe également si le secouriste est seul !

CAS PARTICULIERS :

Enfant / nourrisson / victime de la noyade :

- apprécie l'état de conscience
- assurer la LVA
- vérifier l'absence de ventilation....
- vérifier l'absence de circulation (pouls carotidien, nourrisson pouls, huméral).... Si oui
- réaliser 5 insufflations initiales et contrôle si réactions signes de vies...
- 1 minute cycles RCP 15/2 (5cycles) chez Enfant et nourrisson **secouriste seul** avant l'alerte.

30

Adulte victime de la noyade :

- Même **CAT** chez l'adulte victime d'une noyade sauf RCP 30/2 (5cycles).
- Les 5 cycles représentent une durée d'environ 1 min et 50 secondes pour un **secouriste seul** avant de pouvoir donner l'alerte. (Si un renfort est présent faire alerter et continuer les gestes de secours qui s'imposent)